

薬

'10/'11

歯科

疾患名から
治療薬と処方例が
すぐわかる本

編者

朝波惣一郎／王 宝禮



各疾患のスペシャリストが治療薬と
全身疾患をもつ患者への選択薬を開示



C O N T E N T S

わかりやすい処方集
薬品名® 1錠100mg 1回1錠 毎食後 4日分

本書の使い方

ベストな処方箋の書き方
処方表記の解釈の違いによる
薬剤量の間違い
知っておきたい投薬のポイント
薬の副作用、相互作用の基本

いま知りたい薬の話

抗凝固薬と抗血小板薬
ビスマスフォネート系薬物
(BP製剤)
歯周病に対する抗菌薬の
投薬基準
漢方薬の保険適用の考え方
禁煙補助薬のメカニズム
ジェネリック医薬品(後発品)とは

Chapter 1 炎症

智齒周囲炎
インプラント周囲炎
顎骨膜炎
顎骨骨髄炎(ビスマスフォネー
ト系薬物による)
化膿性骨髄炎

びまん性硬化性骨髄炎

頸下リンパ節炎
蜂窩織炎
急性唾液腺炎
慢性唾液腺炎
慢性硬化性唾液腺炎
線維素性唾液管炎
(クスマウル病)
流行性耳下腺炎
外歯瘻
口腔梅毒
口腔結核
顎放線菌症
歯性上頸洞炎

Chapter 2 外傷

歯の脱臼
歯槽突起骨折
口腔軟組織の裂傷
顎骨骨折

Chapter 3 口腔粘膜疾患

舌炎(鉄欠乏性貧血)

舌炎(悪性貧血)

黒毛舌
地图状舌
溝状舌
正中菱形舌炎
口腔カンジダ症
クインケ浮腫
薬物性口内炎
白板症
紅板症
扁平苔癬
天疱瘡
類天疱瘡
再発性アフタ
ベドナーアフタ
褥瘡性潰瘍
急性疱疹性歯肉口内炎
帶状疱疹
単純疱疹(口唇ヘルペス)

Chapter 4 機能・感覚異常

末梢性顔面神経麻痺/
ベル麻痺(特発性顔面神経麻痺)
術後三叉神経知覚障害
三叉神経痛

舌咽神経痛

舌痛症
顎関節症における関節痛
顎関節症における筋痛
味覚障害

Chapter 5 その他/口腔外科疾患

皮下気腫
ドライソケット
血腫
異常出血
小手術・抜歯後疼痛
口腔乾燥症

Chapter 6 歯の疾患

う蝕
急性根尖性歯周炎
慢性根尖性歯周炎
歯根未完成歯の歯髓炎
歯根未完成歯の感染根管
象牙質の知覚過敏症
露出歯根の知覚過敏症
歯根外部吸収

う蝕の予防薬
変色歯

Chapter 7 歯周疾患

歯肉炎
剥離性歯肉炎
壞死性潰瘍性歯肉炎
慢性歯周炎
侵襲性歯周炎
歯肉増殖症
歯周手術後の疼痛
急性歯周膜病
口臭症
歯周病の検査キット
歯周病予防薬(軽度歯周炎/
歯肉炎/口臭症)
歯肉(メラニン)色素沈着

●サイズ:B5判 ●200ページ ●定価:5,145円(本体4,900円・税5%)



クインテッセンス出版株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目2番6号 クイントハウスビル

TEL. 03-5842-2272 (営業) FAX. 03-5800-7592 <http://www.quint-j.co.jp/> e-mail mb@quint-j.co.jp



本書は、各疾患のスペシャリストに日常使っている治療薬を第1選択薬から開示していただき、投薬効果によっては次の処方に変更できる特徴を持っている。また超高齢社会にあわせて、全身疾患を持つてある患者への処方を掲載しており、投薬のポイントとともに臨床現場で使いやすい処方集となっている。処方量を間違えると事故につながる恐れがある。今年度は厚生労働省からの通告にしたがい、処方量に誤解を招かないように1回量を明記し、<薬剤名®、1錠100mg、1回1錠、1日3回、毎食後、4日分>とわかりやすい表記としている。診療室の常備書。

本書の特徴 1

各疾患の スペシャリストの処方集

インプラント周囲炎



全身疾患などへの対応

通常の投薬量よりも治療薬の使用量を多くする。オッセオインテグラントに対する影響はほとんどない。

投薬の背景


インプラント周囲炎は、オッセオインテグラントに対する影響はほとんどない。

本書の特徴 4

投薬のポイント

本書の特徴 5

処方量に誤解を招かないよう 1回量を明記



本書の特徴 2

投薬効果によって、 次の処方に変更できる

本書の特徴 3

全身疾患を持っている 患者への処方

クインケ浮腫

外木守謹

第1選択薬	ジプロバクタミン(ペリオクリン®)1錠4mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
第2選択薬	トロカジン(アラックス®)1錠25mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
第3選択薬	ブドニゾロン(フレニコ®)1錠5mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
選択薬	ジフェニヒドラン(レスタクシムコーキ®)1%クリーム 1回適量

全身疾患などへの対応	トキサリサム(トキサリサム®)1錠250mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
心臓疾患	ジフェニヒドラン(レスタクシムコーキ®)1錠4mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
肝臓疾患	ジフェニヒドラン(レスタクシムコーキ®)1錠250mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
腎臓疾患	ジフェニヒドラン(レスタクシムコーキ®)1錠250mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
高血圧疾患	ジフェニヒドラン(レスタクシムコーキ®)1錠4mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
糖尿病	ジフェニヒドラン(レスタクシムコーキ®)1錠250mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
腎臓疾患	ジフェニヒドラン(レスタクシムコーキ®)1錠250mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
精神疾患	ジフェニヒドラン(レスタクシムコーキ®)1錠250mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
妊娠	ジフェニヒドラン(レスタクシムコーキ®)1錠250mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
授乳	ジフェニヒドラン(レスタクシムコーキ®)1錠250mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分

可能である

肝臓疾患者
ジ・クロルフルカルミラミレイン酸塩(ジメトキシメチルカルミン酸塩) 1錠4mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
トロカジン(アラックス®)1錠250mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
トキサリサム(トキサリサム®)1錠250mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
高血圧患者
ジ・クロスカルジジメタリカルミン酸塩(ジメトキシメチルカルミン酸塩) 1錠4mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
セドロキシジン(アラックス®)1錠25mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
精神疾患者
ジ・クロスカルジジメタリカルミン酸塩(ジメトキシメチルカルミン酸塩) 1錠4mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
妊娠
セドロキシジン(アラックス®)1錠25mg 1回1錠 1日3回 每食後 3日分
授乳

禁戒の背景

尿崩症等に突然死する可能性。
アミノ酸代謝異常症と有する疾患とされているが、脂肪酸に代謝能の低下する疾患等、その他の代謝能の低下する疾患等、尿崩症等に突然死する可能性。
アミノ酸代謝異常症と有する疾患とされているが、脂肪酸に代謝能の低下する疾患等、尿崩症等に突然死する可能性。
主な抗凝血薬セドロキシジン、セドロキシジン酸塩、コマツテリオドリドの禁忌となる疾患等、その他の代謝能の低下する疾患等、尿崩症等に突然死する可能性。
主な抗凝血薬セドロキシジン、セドロキシジン酸塩、コマツテリオドリドの禁忌となる疾患等、その他の代謝能の低下する疾患等、尿崩症等に突然死する可能性。

禁忌のポイント

主な抗凝血薬セドロキシジン、セドロキシジン酸塩、コマツテリオドリドの禁忌となる疾患等、その他の代謝能の低下する疾患等、尿崩症等に突然死する可能性。

見逃せない副作用、相互作用

1. 第2世代抗ヒスタミン薬(ジメトキシメチルカルミン酸塩)、ジ・クロルフルカルミン酸塩(ジメトキシメチルカルミン酸塩)、セドロキシジン(アラックス®)との併用による心拍出量の増加。
2. 飲酒による心拍出量の増加。
3. 飲酒による心拍出量の増加。

注文書

薬'10/'11 歯科 疾患名から治療薬と処方例がすぐわかる本 モリタ商品コード:805404

冊注文します。

●お名前

●貴院名

●ご住所

●TEL

●FAX

●ご指定納入店

支店・営業所

※ご記入いただいた個人情報は、弊社の新刊案内、講演会等の案内に利用させていただきます。

※ご指定納入店がない場合は送料を頂き、代金引換宅配便でお送りさせていただきます。